LE SCIENZE *live*

C'è vita sugli altri pianeti?

Cosa rende unico e

abitabile il pianeta Terra

Giovanni Muttoni

La vita in una
goccia d'acqua:
C-H-N-O-P-S

Published on: Feb 21, 2014

Follow the Water

LE SCIENZE *live*

Mercurio

senza atmosfera

+430 °C sul lato diurno,

-180 °C sul lato notturno

Venere

92 bar di pressione
atmosferica

(come stare a 1000 m sott'acqua)

96% CO₂,

temperatura

al suolo +460 °C

Phosphine gas in the cloud decks of Venus

Jane S. Greaves^{1,2}, Anita M. S. Richards³, William Bains⁴, Paul B. Rimmer^{5,6,7}, Hideo Sagawa⁸, David L. Clements⁹, Sara Seager^{4,13,14}, Janusz J. Petkowski⁴, Clara Sousa-Silva⁴, Sukrit Ranjan⁴, Emily Drabek-Maunder^{1,10}, Helen J. Fraser¹¹, Annabel Cartwright¹, Ingo Mueller-Wodarg⁹, Zhuchang Zhan⁴, Per Friberg¹², Iain Coulson¹², E'lisa Lee¹² and Jim Hoge¹²

Measurements of trace gases in planetary atmospheres help us explore chemical conditions different to those on Earth. Our nearest neighbour, Venus, has cloud decks that are temperate but hyperacidic. Here we report the apparent presence of phosphine (PH₃) gas in Venus's atmosphere, where any phosphorus should be in oxidized forms. Single-line millimetre-waveband spectral detections (quality up to -15σ) from the JCMT and ALMA telescopes have no other plausible identification. Atmospheric PH₃ at ~ 20 ppb abundance is inferred. The presence of PH₃ is unexplained after exhaustive study of steady-state chemistry and chemical pathways, with no currently known abiotic production routes in Venus's atmosphere, clouds, surface and sub-surface, or from lightning, volcanic or meteoritic delivery. PH₃ could originate from unknown photochemistry or geochemistry, or, by analogy with biological production of PH₃ on Earth, from the presence of life. Other PH₃ spectral features should be sought, while in situ cloud and surface sampling could examine sources of this gas.

SCIENCE

Promising sign of life on Venus might not exist after all

The detection of phosphine gas in the clouds of Venus—a possible sign of life—might be due to a fluke in data processing, new analyses suggest.

7 MINUTE READ

BY [NADIA DRAKE](#)

PUBLISHED OCTOBER 23, 2020

LE SCIENZE *live*

Marte

tenue atmosfera

temperatura media $-60\text{ }^{\circ}\text{C}$

con punte di $-140\text{ }^{\circ}\text{C}$

Titano

(luna di Saturno)

temperatura $-180\text{ }^{\circ}\text{C}$

piove metano

Europa

(luna di Giove)

coperta di ghiaccio

temperatura media $-170\text{ }^{\circ}\text{C}$

Pianeta Terra

A scenic view of a tropical coastline. In the foreground, there are dark, jagged volcanic rocks. A small, crescent-shaped black sand beach is nestled between the rocks and the water. The water is a vibrant turquoise color, with white foam from waves breaking against the shore. The background is a dense, lush green forest covering a hillside, with several palm trees visible. The sky is bright blue with scattered white clouds.

LE SCIENZE *live*

Figure 3. Estimates of meteorite-impact rate for first 2 b.y. of Earth history. Two hypotheses are shown: exponential decay of impact rate (dashes, Hartmann et al., 2000) and cool early Earth–late heavy bombardment (solid curve, this study). Approximate half-life is given in million years for periods of exponential decline in flux. In either model, spikes occurred owing to isolated large impacts. Evidence for liquid water comes from high- $\delta^{18}\text{O}$ zircons (>4.4 to >4.0 Ga) and sedimentary rocks (Isua, 3.8–3.6 Ga). The cool early Earth hypothesis (solid curve) suggests that impact rates had dropped precipitously by 4.4 Ga, consistent with relatively cool conditions and liquid water.

Valley et al. (2002)

Risposta:
alziamo gli occhi
al cielo...

Formazione di Dresser,
Pilbara, Western Australia:
roccia sedimentaria
deposta in presenza
di acqua liquida
3.48 Miliardi di anni fa

Come fa la Terra
a mantenere
l'acqua liquida
in superficie da
~4 miliardi di anni?

EARTH'S ENERGY BUDGET

Senza gas serra,
la temperatura
media superficiale
sarebbe di -20°C

The Greenhouse Effect

Some sunlight that hits
the earth is reflected.
Some becomes heat.

CO_2 and other gases
in the atmosphere
trap heat, keeping
the earth warm.

ATMOSPHERE

Da dove viene la CO₂ atmosferica?

Atmosfera: ~10³ Giga Ton di CO₂
Oceani: ~10⁵ Giga Ton di CO₂

Flusso vulcanico di CO₂
in Atmosfera/oceano =
0.26 Giga Ton/anno

Mantello: ~10⁸ Giga Ton di CO₂

Giga = 1 miliardo

Quant'è la CO₂ atmosferica?

Attualmente ~415 ppm e in crescita +100 ppm in 60 anni.
I tassi sono di **~1.5 ppm/anno e in crescita (l'aumento accelera)**

... e nel passato?

LE SCIENZE *live*

Low $p\text{CO}_2$ and Glacial Modes in Phanerozoic

NO GHIACCIO

1000 ppm

GHIACCIO

Royer (2006)

Glaciazioni neogeniche (recenti)

La soglia dei ~1000 ppmv CO₂ superata a circa 34 Ma

Lowenstein and Demicco (2006)

Axel Heiberg,
Canada, 79°N,
adesso

Figure 1 | The early Eocene Arctic basin, site locations, and geographic distribution of the *Azolla* pulse in adjacent basins.

Brinkhuis et al. (2006)

Figure 7. Reconstruction of Eocene High Arctic rain forest environment with hippo-like *Coryphodon* in the foreground; inset shows detail of Eocene Arctic tapir *Thuiladanta*. Both images are courtesy of the American Museum of Natural History (© AMNH/D. Finnlin).

Axel Heiberg,
Canada, 75°N
50 milioni di anni fa
> 1000 ppmv CO₂

< 1000 ppmv CO₂

Antarctic glaciation and pCO₂

DeConto & Pollard (2003)

Figure 2. Comparison of the original data (black line) and an updated version of the 800 kyr CO₂ composite (see supporting information) including the corrected data (gray line) and its 95% uncertainty range (light gray area behind). The record low value at 667 kyr B.P. as found by Lüthi *et al.* [2008] remains as such; however, the average value for the period of 650–799 kyr B.P. changes significantly by +5.6 ppm.

~280 ppmv CO₂
preindustrial

~180 ppmv CO₂

Modern World

Last Glacial Maximum 18,000 years ago

Cosa potrebbe succedere sotto la soglia dei ~180 ppmv?

Fig. 10. (a) Zonal mean surface water temperature (in degrees Celsius) of the model ocean obtained from the six experiments. Dots indicate the observed values in the northern hemisphere from the U.S. Navy Hydrographic Office [1964]. (b) Zonal mean thickness of sea ice (in meters) in the model ocean from the 1X, X/√2, and X/2 experiments.

Manabe and Bryan (1985)

Ghiaccio a livello del mare
fino alle nostre latitudini
-> **iceberg a Genova?**

LE SCIENZE *live*

E sotto i ~100 ppm?

albedo fuori controllo
Snowball Earth(s) 700-650 Ma

**Come fa la Terra a mantenere
l'acqua liquida in superficie
da ~4 miliardi di anni?**

OVVERO

**Come fa la CO₂ a mantenersi
(quasi sempre) sopra ~100 ppm
(Terra ghiacciata)
e sotto ~30.000 ppm
(oceani in ebollizione)?**

Da ppmv a Giga tonnellate

Un modo per eseguire il passaggio di unità di misura è esprimere ppmv in % di volume, indi % di massa e procede conoscendo massa molare della CO₂, massa molare dell'aria standard e massa totale dell'atmosfera.

1 ppmv di CO₂ in atmosfera = 0.0001% del volume totale (100%) dell'atmosfera

Massa molare CO₂ = **44 g/mol**

Massa molare aria (composta da 78% N₂, 21%O₂ e 1%Ar) = **32.6 g/mol**

Una mole di CO₂ pesa (44 / 32.6) = 1.3 volte una mole d'aria

0.0001% in volume di CO₂ = 0.00013% in massa di CO₂

La massa dell'atmosfera terrestre è di circa 5.1*10E18 kg

Lo 0.00013% in massa di questa atmosfera è fatto di CO₂, ovvero **6.6 Giga tonnellate di CO₂**

Regola generale: 1 ppmv CO₂ = ~6.6 Gt CO₂

INPUT di CO₂ dai vulcani
~0.26 GTon CO₂/anno

Senza output in meno di un milione
di anni si accumulerebbero decine
di migliaia di ppmv di CO₂
e gli oceani non esisterebbero...

Occorre che la CO₂ esca dall'atmosfera a una velocità simile a quella di entrata. Occorre un output

*Flussi, livelli, stati stazionari:
l'esempio della vasca da bagno*

OUTPUT di CO_2

A lush green forest landscape with misty mountains in the background. The foreground is filled with dense, vibrant green foliage. In the mid-ground, a tall, slender tree stands prominently. The background features rolling hills and mountains partially shrouded in a soft, white mist or low clouds, creating a sense of depth and atmosphere. The overall scene is bright and natural, suggesting a tropical or subtropical environment.

Principale 'macchina'
di sottrazione di CO₂:
rocce silicatiche basaltiche
all'equatore

OUTPUT di CO₂

LE SCIENZE *live*

OUTPUT di CO_2

OUTPUT di CO₂

2 moli di CO₂ sottratte per alterazione rocce silicatiche;
1 mole reimpressa durante la precipitazione dei carbonati;
1 mole sottratta nei carbonati che diventano rocce calcaree

$$2-1=1$$

OUTPUT di CO_2

OUTPUT di CO_2

LE SCIENZE *live*

Tettonica a Zolle e ciclo del C a lungo termine

+ organic carbon cycle:

Trend climatici:
minimi disequilibri
tra INPUT e
OUTPUT di CO₂
integrati
nel tempo
geologico

Se CO₂ input > CO₂ output
tendenza al riscaldamento
Se CO₂ input < CO₂ output
tendenza al raffreddamento

Trend climatici
geologici avvengono
su scala dei milioni di
anni a tassi di
0.0001-0.001 ppm/yr.

Escursioni climatiche
rapide (PETM, Oi-1)
avvengono su scala
dei 100.000 anni
a tassi di
0.1-0.5 ppm/yr.

Ultimi 60 anni: tassi di 1.5 ppm/yr e in crescita

Una riserva di CO₂ fossile, accumulata in milioni di anni sotto forma di carbon fossile, è immessa rapidamente nel ciclo del carbonio a breve termine (atmosfera, idrosfera, biosfera).

Ultra long term carbon cycle

The short term land and ocean cycle is shown by the thin lines inside the thick lines of the long term ocean cycle.

Spunti di riflessione

- La vita sulla Terra esiste da quando gli oceani di acqua liquida hanno potuto stabilizzarsi – probabilmente a partire da circa 3.9 Gy.
- Senza CO₂ non ci sarebbe vita poiché la Terra sarebbe un pianeta completamente e perennemente gelato.
- Durante la maggior parte (~80%) degli ultimi ~600 milioni di anni, la Terra non ha avuto coperture glaciali significative e la CO₂ si è mantenuta sopra la soglia dei ~1000 ppm.
- Due intervalli glaciali hanno caratterizzato gli ultimi ~600 milioni di anni: da 320 a 280 milioni di anni fa e da 34 milioni di anni ai giorni nostri. In entrambe i casi si è scesi sotto la soglia dei ~1000 ppm di CO₂
- Episodi glaciali estremi sono accaduti tra 700 e 650 milioni di anni fa con coperture glaciali estese anche a basse latitudini a livello del mare e CO₂ sotto i 150 ppm.
- Durante tutte queste fluttuazioni climatiche, la CO₂ aumenta/diminuisce a tassi a lungo termine (trend) di 0.0001-0.001 ppm CO₂/anno. Esistono 'aberrazioni' climatiche rapide (PETM) con velocità di 0.1-0.3 ppm CO₂/anno.

Spunti di riflessione

- Il trend degli ultimi 60 anni è di **1.5 ppm CO₂/anno e in crescita**. Sarebbe comunque molto più alto (3-6 ppm/anno) se la Terra non avesse comunque attivato meccanismi di rimozione di CO₂ negli oceani, nelle rocce carbonatiche, e tramite il seppellimento di materia organica.
- Le attuali immissioni antropogeniche di CO₂ sono ~10 volte maggiori di quelle dell'episodio di riscaldamento più rapido e massiccio conosciuto nel record geologico (PETM).
- Le attuali immissioni antropogeniche di CO₂ sono ~140 volte maggiori di quelle di tutti i vulcani terrestri combinati (che regolano i livelli di CO₂ geologica a lungo termine).

Riflessione personale

- Un pianeta privo di ghiacci non è di per sé una brutta notizia (punto di vista neutrale oggettivo scientifico). Il problema è che con gli attuali tassi di immissione di CO₂, stiamo raggiungendo tale condizione (superamento soglia dei ~1000 ppm di CO₂) in tempi troppo rapidi (secoli) e ingestibili per la società contemporanea, numerosa, complessa e statica.
- La terra possiede meccanismi naturali di rimozione della CO₂, e quando l'immissione antropogenica cesserà, la terra ritornerà (con i suoi tempi) alle condizioni pre-disturbo (preindustriali).
- **Dunque, non dobbiamo salvare la Terra, ma la nostra civiltà.**

Grazie

LE SCIENZE *live*

~30.000 ppmv CO₂ = ~200.000 Gt CO₂: gli oceani terrestri vanno in ebollizione
(mai successo)

1000-4000 ppmv CO₂ = 6600-26000 Gt CO₂: valori 'comuni' presenti nell'80% del tempo geologico relativo agli ultimi ~550 milioni di anni

Solo per un ~20% di tempo geologico la Terra è scesa sotto ~1000 ppmv CO₂ = ~6600 Gt CO₂: soglia tra terra senza ghiacci e terra con inizio formazione ghiacci alle alte latitudini (ad esempio Antartide e Artide)

~280 ppmv CO₂ = ~1800 Gt CO₂: interglaciali pleistocenici (calotte glaciali alle alte latitudini ben sviluppate)

~180 ppmv CO₂ = ~1200 Gt CO₂: massime espansioni glaciali pleistoceniche (i ghiacci coprono buona parte dell'Europa centro-settentrionale e del Nord America)

~150-100 ppmv CO₂ = ~1200 Gt CO₂: iceberg a Genova?

<100 ppmv CO₂ = < 660 Gt CO₂: Snowball Earth (è successo)

Rates of release of anthropogenic carbon 1959-2015

37 Gt CO₂/anno
~6 ppm/anno

18 Gt CO₂/anno
~3 ppm/anno

7 Gt CO₂/anno
~1 ppm/anno

~0.5 Gt di emissioni di CO₂ in più ogni anno che passa

annual mean growth rate of CO₂ at Mauna Loa

**I TASSI DI IMMISSIONE DI CO₂ ANTROPOGENICA
NON CORRISPONDONO AI TASSI DI CRESCITA DI
CO₂ ATMOSFERICA!**

LA TERRA REAGISCE !

MONDADORI
EDUCATION

Rizzoli
EDUCATION

FORMAZIONE SU MISURA

WWW.FORMAZIONESUMISURA.IT

LE
SCIENZE
live